

**DISTRETTO 5 PAVULLO NEL FRIGNANO**  
**PEDIATRIA DI COMUNITA'**

**Scheda per la Richiesta della**  
**Vaccinazione AntiRotavirus**

**Il Minore** \_\_\_\_\_, **nato il** \_\_\_\_\_

può effettuare la Vaccinazione contro il Rotavirus in associazione con le prime dosi vaccinali.

Data \_\_\_\_\_

Il Pediatra/Medico curante

\_\_\_\_\_

**Note per i genitori:**

Il vaccino contro il Rotavirus viene somministrato per bocca. La 1<sup>a</sup> dose verrà somministrata in occasione delle 1<sup>e</sup> vaccinazioni previste dal calendario regionale a 2/3 mesi di età. La 2<sup>a</sup> dose dopo 4/5 settimane dalla 1<sup>a</sup> dose.

Il vaccino non rientra tra quelli offerti gratuitamente dalla regione, ma può essere effettuato a un prezzo regolato da apposita gara regionale. Attualmente il costo di tutto il ciclo vaccinale contro il Rotavirus (effettuato con il vaccino Rotarix) è pari a **94.80 euro** da pagare prima della esecuzione della 1<sup>a</sup> dose.

La vaccinazione è controindicata in caso di anamnesi positiva per invaginazione intestinale, nei soggetti con immunodeficienza combinata, malformazione congenita, non corretta, del tratto gastrointestinale.

Non ci sono studi sulla sicurezza nei prematuri sotto alle 27 settimane di età gestazionale

La vaccinazione deve essere rimandata nei soggetti affetti da diarrea o vomito e in quelli affetti da malattie acute febbrili.

Dopo la vaccinazione il virus viene escreto con le feci, con un picco massimo intorno al settimo giorno e soprattutto dopo la 1<sup>a</sup> dose, pertanto il vaccino deve essere somministrato con cautela in individui che hanno stretti contatti con soggetti immunodeficienti o immunocompromessi o sottoposti a terapia immunosoppressiva.

Le persone che hanno stretti contatti con i bambini vaccinati di recente devono essere invitati ad una attenta igiene personale (lavaggio delle mani).

Gli effetti collaterali più frequenti possono essere diarrea ed irritabilità; quelli non comuni: dolori addominali, flatulenza e dermatite. Sebbene negli studi clinici non sia stato osservato un aumento del rischio di invaginazione intestinale a seguito della somministrazione del vaccino rispetto al placebo, sulla base di dati provenienti da studi post-marketing, non può essere escluso un piccolo aumento del rischio di invaginazione intestinale in un periodo di 31 giorni e nella maggior parte dei casi entro i 7 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino.

I genitori, pertanto, devono essere avvisati di riferire sintomi quali: dolori addominali., vomito persistente, presenza di sangue nelle feci, gonfiore addominale e/o febbre elevata.

... ..

**La vaccinazione va prenotata presso l'Ambulatorio Vaccinazioni Pediatriche di Pavullo,  
in viale Martiri, 63**

*presentandosi con la presente richiesta o telefonando al n.: **0536 29189***

*nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12.30*