

Medicazione cordone ombelicale

Scritto da Administrator

Mercoledì 12 Ottobre 2011 07:02 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Ottobre 2011 07:14

La medicazione del moncone ombelicale nel neonato



Quanto prima □ uscirete dall'Ospedale con il neonato tanto maggiore sarà la necessità di medicare a casa il moncone (cordone) ombelicale.

Il cordone ombelicale del neonato si essicca fino alla mummificazione (processo fisiologico di essiccamento), che ne favorisce il distacco solitamente entro il 15° giorno dalla nascita. Per questo nella cura del bambino bisogna seguire alcuni accorgimenti.

Lavatevi sempre le mani con acqua e sapone prima di medicare il cordone ombelicale;

Medicazione cordone ombelicale

Scritto da Administrator

Mercoledì 12 Ottobre 2011 07:02 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Ottobre 2011 07:14

evitate che rimanga umida la zona per la presenza di urine (soprattutto nel maschietto) , feci, garze umide, ecc.;

cambiate la medicazione con garza sterile un paio di volte al giorno controllando l'assenza di secrezioni o di sangue, spie di possibile infezione locale, e cercate di fare in modo che rimanga sempre esterna al pannolino;



non è obbligatorio né necessario alcun medicamento per la mummificazione del cordone ombelicale (e quindi per la successiva caduta) ma alcuni prodotti possono accelerarne la caduta (es. zucchero salicilico)

per tenere ferma la garza applicate una fascetta elastica contenitiva e non cerotti;

controllate più frequentemente il cordone se intorno all'attaccatura la pelle appare rossa o con secrezioni giallo-verdastre o con sangue coagulato o emana cattivo odore, se persistono queste alterazioni, rivolgetevi al Pediatra.

L'ombelico, sino al momento della avvenuta completa cicatrizzazione, è considerato una delle principali "porte" d'entrata dei germi e quindi di infezione neonatali.

Medicazione cordone ombelicale

Scritto da Administrator

Mercoledì 12 Ottobre 2011 07:02 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Ottobre 2011 07:14

Ricordate: il mancato distacco del moncone del cordone ombelicale, talora anche dopo 15-20 giorni, o la presenza d'infezioni ombelicali o peri-ombelicali richiedono l'intervento e le cure dei sanitari



Una volta caduto il cordone va controllata la cicatrice ombelicale per verificarne l'eventuale presenza di secrezioni importanti o granulomi (fungo ombelicale) valutabili dal Pediatra, in assenza di ciò continuare a tenere asciutta la cicatrice (eventualmente utilizzando acqua ossigenata per la detersione) per 3-4 giorni.